* Kendi haline bırakılmış meyve bahçeleri ve bakımsız ağaçlar bulaşma kaynağı oluşturur.

* Zararlı birkaç km uçabildiğinden üreticiler kendi bahçeleri içinde ve yakınındaki bahçelerde topluca zararlı ile mücadele önlemlerini almalıdır.

BİYOTEKNİK MÜCADELE

Zararlıyı incelemek amacıyla Nisan ayından itibaren 5 da alan için en az 2 adet tuzak asılmalıdır. 0,5-1 lt lik ağzı kapalı şeffaf plastik şişlerin üst kısmına 3mm'den büyük olmayan 8-10 adet delik açılıp içerisinde 150ml elma sirkesi konulmalıdır. Hazırlanan sirkeli tuzaklar ağaçların ulaşılabilecek yüksekliğine gölgede kalacak şekilde asılmalıdır.

Zararlı ile mücadele uygulanan kitle halinde tuzaklama metodu popülasyon çok düşük olduğunda etkili olabilmektedir. Zararlı ile mücadele erginlere karşı yapılması gerekir. Bunun için; sirke tuzakları erginler yumurta koymadan önce bulaşık olduğu bilinen bahçe ve komşu bahçelerinin etrafını çevreleyecek şekilde Nisan ayından itibaren asılmalıdır. Bahçenin tüm kenarları boyunca 1 sıra ve en fazla 5 metre aralıkla sirke tuzakları asılır. Bahçe içindeki diğer ağaçlara ise ağaç başına ve 4-5 adet sirke tuzakları asılarak kitle halinde mücadele yöntemi uygulanmalıdır.

UNUTMAYIN!
Olgunlaşmış meyveler bulaşma kaynağı oluştururlar.

KİMYASAL MÜCADELE

Nisan ayından itibaren asılan sirkeli tuzaklarda en az bir tane ergin yakalandığında o bahçe bulaşık kabul edilir ve bakanlıkça ruhsatlı bitki koruma ürünü ile kimyasal mücadeleye başlanılmalıdır. Bu zararlı ile mücadelede diğer böceklere karşı yapılan kimyasal mücadele ile aynı tarihlere rastlıyorsa ayrıca ilaçlamaya ihtiyaç yoktur.

Zararlı hakkında ayrıntılı bilgiyi İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alabilirsiniz.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tel: 0 332 322 34 60
Fax: 0 332 322 43 15

konya@tarimorman.gov.tr

http://konya.tarimorman.gov.tr

KONYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ

Drosophila suzukii

TANIMI

Ergini, 2-3 mm uzunluğunda açık sarı veya kahverengi, gözleri parlak kırmızı renklidir.Erkeklerin kanatlarında siyah noktaları vardır.Larva, beyaz silindirik vücutlu ve 3,5 mm. boyundadır. Pupa, 2-3 mm kırmızımsı kahverengidir. Meyvenin içinde veya toprakta bulunur.

Pupası

Larvası

Ergini

KONUKÇULARI

Kiraz, şeftali, erik, kayısı, elma, armut, üzüm, çilek v.b.

ZARARI

Önemli bir karantina zararlısı olan Drosophila suzukii diğer sirke sineği türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde ve yere düşmüş çürümekte olan meyvelerde beslenirler.Zarar larvanın meyve içinde beslenmesi suretiyle meydana gelir.

Bir meyvede birden çok larva bulunduğu için meyvede yumuşama ve çürüme hızla artmaktadır. Daha sonra hastalığa neden olan zararlı organizmalara giriş noktası oluşturur. Bulaşık meyve pazar değerini kaybeder. %80 ürün kaybı olabilmektedir. Kanadı noktalı sirke sineğinin ihracatta toleransı sıfırdır.

KANADI NOKTALI SİRKE SİNEĞİ

MÜCADELESİ

KÜLTÜREL MÜCADELE

* Meyveler olgunlaştığında hemen hasada başlanılmalı, hasat süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı ve hasattan sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır.

* Bahçeler kontrol edilmeli yere dökülen ve ağaçta asılı kalan meyveler toplanmalı ve imha edilmelidir.