



hazırlığından birkaç gün önce tırmık altına, kalan azotun 1/3-1/2'i ise baş(üst) gübresi olarak 4 gerçek yapraklı dönemde verilir. Fosforlu gübrenin 2/3'ü ile potasyumun tamamı sonbaharda sürümden önce pulluk altına atılır. Saf olarak 14-18 kg/da azot, 11-14 kg/da fosfor, 4-6 kg/da potasyum verilebilir.

Hasat

İç Anadolu da ekimden 180-185 gün sonra pancar hasat olgunluğuna gelmektedir. Elle veya makine ile hasat edilen pancarlar temizlenmiş ve baş kesimi düzgün olarak belirlenen program dahilinde Fabrika Merkez veya Taşra kantarlarında tesellüm edilir.

İletişim:

✉ konya@tarimorman.gov.tr


🌐 <http://konya.tarimorman.gov.tr>

☎ Tel: 0332 322 34 60 Fax: 0332 322 43 15

📘 @konyatarimorman

📷 konyatarim

🐦 @konyaitarim



T.C. KONYA VALİLİĞİ
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİCİLİĞİ





**Toprak
Hazırlığı**

Şeker pancarı derin köklenen bir bitki olarak derin gevşetilmiş bir toprak ister. Aksi takdirde kökler yüzde kalır ve kısmen çatallanır, yeterince büyüüp gelişemez, pancar verimi ve teknolojik kalitesi düşer. Toprak hazırlığı ön bitki hasadından hemen sonra sapın biyolojik bozuşmasını sağlamak yaz sonu ve sonbaharın yağışlarını toprakta tutmak için Anız 7-10 cm derinliğinde bozularak başlanır. Ağır bünyeli topraklarda sıkışık pulluk taban tabakasını kırılması için Temmuz-Ekim ayları arasında 4-5 yılda bir 50-60 cm derinliğinde ve 90 cm genişliğinde baklava dilimi şeklinde Dipkazan çekilir.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde sonbahar derin sürümü; taban gübresinin karıştırılması, çok yıllık yabancı otların yok edilmesi, baharın iyi bir tohum yatağı hazırlığı ve toprağın zamanında tava gelmesi için mutlaka yapılmalıdır. İlkbahar toprak hazırlığında tohum yatağındaki tavi korumak kılcak toprak yapısını kırmamak için toprak tohum ekim derinliğinden daha derin işlenmemelidir.

Ekim

İç Anadolu da mart ayı ortasından itibaren ekime toprağın 0-5 cm derinlikte sıcaklığı düzenli olarak 5-7 °C ve üzerine ulaşınca başlanır. İlaçlı çıplak veya kaplanmış genetik monogerm tohumlar, sıra arası 45 cm mesafeye ve 2-4 cm toprak derinliğine traktör ilerleme hızı 4-4,5 km/saat hızında tutularak mibzerle ekimi yapılır sıra üstü 22-28 cm mesafede teklenir.

Bakım

Ekimden sonra yüzeyi 1,5-2 ay kadar açık kalan tarlada yabancı ot gelişimini önlemek için işçi ve traktör çapası, ve/veya ot ilaçlaması yapılır. Yüksek bir kök verimi ile birlikte yüksek teknolojik kalite, yer(Bölge), tarla(Toprak), yıl ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak sıralar üzerinde düzgün dağılımla hasatta yüksekliği 7.000-9.000 bitki/dekar sıklıklarında alınır.



Bakım



Sulama

Sulama

Şeker pancarı su gereksinimi yüksek bir bitki olup yalnızca yeterli yağış ve düzenli sulama şartlarında yüksek miktarda şeker üretir. Sulamaya bitkilerin su gereksinmesine göre en erken pancarlar 8-10 yapraklı döneme gelince başlanır. İç Anadolu da yıllık su tüketimi Nisan 60 mm, Mayıs 90 mm, Haziran 180 mm, Temmuz 270 mm, Ağustos 270 mm, Eylül 180 mm ve Ekim 75 mm olmak üzere toplam 1125 mm'dir. Bu miktarın 300-460 mm'si yıllık yağış 665-825 mm'si de sezonda sulama ile karşılanır.

Gübreleme

Şeker pancarı beslenmesinde ana besin maddeleri azot (N), fosfor (P2O5) ve potasyum (K2O) büyük önem taşır. Tarlanın verimlilik düzeyinin korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için bu ana besin maddelerince desteklenmesi gerekir. Öngörülen azotun 1/2-2/3'ü ile fosforun 1/3'ü tohum yatağı